

绝密 ★ 考试结束前

全国 2014 年 10 月高等教育自学考试
精神障碍护理学试题
课程代码 :03009

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 属于思维逻辑障碍的精神症状是
 - A. 痴呆
 - B. 语词新作
 - C. 思维被洞悉
 - D. 思维迟缓
2. 躁狂状态常见的注意障碍是
 - A. 注意增强
 - B. 注意涣散
 - C. 注意狭窄
 - D. 注意转移
3. 部分性痴呆可见于
 - A. VD
 - B. AD
 - C. PTSD
 - D. ADHD
4. 属于意识范围缩小的意识障碍是
 - A. 昼游症
 - B. 谵妄状态
 - C. 混浊状态
 - D. 梦样状态
5. 属于协调性精神运动兴奋的常见综合症是
 - A. 紧张症候群
 - B. 精神自动综合征
 - C. 躁狂状态
 - D. 柯萨可夫综合征
6. 柯萨可夫综合征多见于
 - A. PTSD
 - B. 脑外伤后精神障碍
 - C. “甲亢”所致精神障碍
 - D. 肾上腺皮质功能亢进所致精神障碍

7. AD 患者病程特点是
A. 潜隐起病，病程迁延
C. 起病较急，病程阶梯性发展
B. 潜隐起病，进行性缓慢进展
D. 慢性起病，阶梯性恶化
8. 精神障碍综合征中的衰退状态常见于
A. 偏执型精神分裂症
C. 单纯型精神分裂症
B. 青春型精神分裂症
D. 紧张型精神分裂症
9. 属于原发性妄想的症状是
A. 妄想心境
C. 非血统妄想
B. 钟情妄想
D. 恶劣心境
10. 对首发的精神分裂症宜选用
A. 安非他酮
C. 氯氮平
B. 苯海拉明
D. 利培酮
11. 患者有异己体验的精神症状是
A. 思维散漫
C. 思维破裂
B. 思维迟缓
D. 思维云集
12. 属于情感波动性障碍的精神症状是
A. 病理性激情
C. 情感高涨
B. 强制性哭笑
D. 欣快
13. 矛盾意向多见于
A. 强迫症
C. 精神分裂症
B. 抑郁症
D. AD
14. 精神自动症综合征的幻觉是
A. 功能性幻觉
C. 内脏性幻觉
B. 反射性幻觉
D. 假性幻觉
15. 冲击疗法主要用于
A. 老年恐怖症患者
C. 伴心血管疾病的恐怖症患者
B. 年轻的恐怖症患者
D. 伴有恐怖症状的分裂症患者
16. 患者看到自己的脸特别丑，常反复照镜子这一症状是
A. 错觉
C. 感知综合障碍
B. 幻觉
D. 强迫动作
17. 患者感到胃内有条小蛇，要求医生手术取出。这一症状是
A. 假性幻觉
C. 感觉过敏
B. 体感异常
D. 内脏性幻觉
18. 患者独处、少语。医生问：“父母对你好吗？”答：“不好”“对医生有什么要求吗？”
答：“没有”这一表现为
A. 思维迟缓
C. 思维中断
B. 思维贫乏
D. 思维破裂
19. 患者说：“我儿子是属牛的，我吃了牛肉就是吃我儿子”这一症状是
A. 象征性思维
C. 思维散漫
B. 逻辑倒错性思维
D. 病理性赘述
20. 意识障碍患者角膜、睫毛、吞咽、对光反射均消失，这一状态是
A. 昏睡
C. 昏迷
B. 谵妄状态
D. 朦胧状态

二、病例串选择题（本大题共有 4 个简要病例，每个病例有 5 个与之相联系的问题，共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合病例题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

病例 1：

女性 20 岁 无业。16 岁时不愿上学，退学回家在社会上混，三个月前与男友分手，之后耳边总能听到声音，命令干这干那，不听就威胁要杀了家人和自己，在声音的命令下服 100 片安定自杀，幸被家人发现送急诊室洗胃，之后声音又命令爬上窗台欲跳楼。平素性格自私、以自我为中心，无吸毒饮酒史。

21. 首先考虑的诊断是

- A. 恶劣心境
- B. 偏执型精神分裂症
- C. 精神活性物质所致精神障碍
- D. 癔症性精神病

22. 治疗首选

- A. 帕罗西汀
- B. 纳曲酮
- C. 齐拉西酮
- D. 扎来普隆

23. 患者在耳边听到别人听不到的声音这一症状属于

- A. 感觉障碍
- B. 思维障碍
- C. 知觉障碍
- D. 注意障碍

24. 对该患者的症状评估从哪方面入手

- A. 评估患者幻听的性质
- B. 评估患者被害妄想的内容
- C. 评估患者生活自理情况
- D. 评估患者关系妄想的内容

25. 该患者如何正确服药吸收效果更好

- A. 饭前服用
- B. 饭后半小时服用
- C. 与饭同服
- D. 饭后 1 小时服用

病例 2：

男性患儿，10 岁，小学四年级。近一年上课坐不住、小动作多，排队不按顺序，参加集体活动吵吵嚷嚷、话多、插嘴、还经常打扰干涉他人活动，且上课注意力不专心，不愿意做作业，学习成绩不好。

26. 首先考虑的诊断是

- A. 躁狂发作
- B. ADHD
- C. Klinefelter 综合征
- D. Tourette 综合征

27. 治疗首选

- A. 盐酸哌甲酯
- B. 氟哌啶醇
- C. 碳酸锂
- D. 氯硝西泮

28. 对患儿的躯体评估内容是

- A. 安全情况
- B. 性格特点
- C. 兴趣爱好
- D. 营养状况

29. 本病最有效的治疗方法

- A. 家庭治疗
- B. 认知治疗
- C. 厌恶疗法
- D. 药物治疗

30. 对患儿的安全护理应做到

- A. 不要参加集体活动
- B. 适当隔离患儿，避免发生冲突
- C. 鼓励患儿参加剧烈的活动，消耗精力
- D. 避免患儿参加竞争性强的游戏

病例 3：

女性 18 岁 高三学生。近半年害怕在公共场所遇见熟悉的人，总认为自己眼睛的余光在蔑视别人，为此惶恐不安，上课注意力不集中，紧张出汗，在家里能安心读书。

31. 首先考虑的诊断是

- A. 恐怖障碍
- B. 偏执型精神分裂症
- C. 广泛性焦虑障碍
- D. 适应性障碍

32. 治疗首选

- A. 阿立哌唑
- B. 择思达
- C. 舍曲林
- D. 丙戊酸钠

33. 本病起病

- A. 有明显的诱因
- B. 隐渐性起病
- C. 受重大刺激后起病
- D. 脑器质性病变后

34. 该患者适用的心理治疗

- A. 暴露疗法
- B. 厌恶疗法
- C. 阳性强化疗法
- D. 暗示治疗

35. 采用模仿、扮演、角色表演等方式的训练是

- A. 社交技能训练
- B. 森田疗法
- C. 放松训练
- D. 认知重建

病例 4：

患儿男性 7 岁 刚上小学。近 2 个月多次出现夜间睡觉时突然坐起、尖叫、呼喊、有时下床冲向门口，伴心慌，呼吸急促，出汗，持续 1 至 10 分钟，醒后对发作不能回忆，查体未见异常。

36. 首先考虑的诊断是

- A. 童年离别焦虑障碍
- B. 恐怖障碍
- C. Ganser 综合征
- D. 睡眠障碍

37. 治疗首选

- A. 观察
- B. 氟哌啶醇
- C. 地西洋
- D. 冲击疗法

38. 下列哪些因素诱发本病

- A. 环境改变
- B. 大脑器质性病变
- C. 经历过度兴奋或精神压力事件
- D. 服用某些药物

39. 本病发生在下述哪个阶段

- A. REM
- B. NREM
- C. 失眠中
- D. 过度睡眠中

40. 对家长进行的健康教育方法

- A. 告知家长疾病的表现及诱发因素
- B. 第二天帮助孩子回忆夜间发生的事件
- C. 尽早实施抗精神病药治疗
- D. 睡前服用安眠类药物

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

41. 虚构
42. 躯体疾病所致精神障碍
43. 创伤后应激障碍
44. 儿童孤独症
45. 行为治疗

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

46. 简述精神障碍患者支持性心理护理内容。
47. 简述谵妄患者临床安全护理措施。
48. 简述如何帮助强迫障碍患者减少和控制症状。
49. 简述心理治疗的作用方式。
50. 简述酒依赖患者的戒断症状。

五、病例分析题（本大题共 1 小题，15 分）

51. 病例分析要求：

- (1) 注明病历中的 10 个精神症状（请在“精神检查”中用划线的方法划出、编号，并在答卷上按你的编号顺序逐条列出所划症状的名称）；
- (2) 说明疾病诊断（症状学和疾病学诊断）；
- (3) 对患者生理状况的评估内容；
- (4) 患者的护理目标。

病历：

女性 57 岁 初中文化 已婚 退休工人

半年前，丈夫做白内障手术，不久母亲患脑血管病住院，患者陪住，着急且比较劳累，三个月后，母亲病情稳定并在康复中，但患者却感心情特别不好，什么都不想干，不想讲话，自觉双下肢无力，发凉，陪住时听说患者做截肢手术，疑心自己也要截肢，伴失眠，食欲不振，体重下降，心情早上最不好，流露过轻生想法，有时又觉心烦，坐立不安。患

者不认为有病，只觉得是太累了，休息休息就行了，因病情不断加重，又有轻生念头，在其丈夫动员下，勉强同意住院治疗。

家族史：无精神病家族史。

个人史：已退休二年，平素性格活泼、开朗，喜欢唱歌，跳舞，无烟酒嗜好，结婚30年，夫妻感情好，有一子一女，50岁绝经。

既往史：无重大疾病史。无药敏史。

入院躯体、神经系统及常规实验室检查未发现明显异常。

精神检查：意识清楚，接触略被动，定向力可，话少，速度慢，觉脑子想问题迟钝，称近一个月来心情特别不好，对什么都不感兴趣，有时心烦，起急，担心多，双下肢发凉，无力，怀疑得了不治之症，“早晚要截肢，瘫痪了”，认为自己生活毫无价值，非常绝望，“与其难受，不如死了”，交谈时表情愁苦，在病房内不和人讲话，多卧床，个人生活料理十分被动。患者否认有病，称“就是累了，没必要住院”。