

绝密 ★ 考试结束前

全国 2016 年 10 月高等教育自学考试 妇产科护理学(一)试题

课程代码:03002

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 妊娠后期被牵拉形成子宫下段的部位是
A. 子宫底部 B. 子宫体部 C. 子宫颈部 D. 子宫峡部
2. 关于第三产程的处理,下列方法正确的是
A. 胎儿娩出后,立即协助娩出胎盘
B. 阴道有少量流血时,立即行人工剥离胎盘术
C. 确定胎盘剥离后,轻轻牵拉脐带,协助胎盘娩出
D. 胎儿娩出 30 分钟后,胎盘仍无剥离征象也无阴道流血,可继续观察
3. 关于不孕症的病因,下列描述错误的是
A. 生殖器结核 B. 子宫发育不良
C. 宫颈口松弛 D. 输卵管炎症
4. 某女,31 岁,会阴侧切分娩后 4 小时,主诉下腹部胀痛,查体:下腹部膀胱区隆起,对该产妇首选的护理措施是
A. 遵医嘱给予止痛剂 B. 遵医嘱给予抗生素
C. 协助产妇排尿 D. 留置导尿管
5. 某女,29 岁,葡萄胎清宫术后,下列出院指导错误的是
A. 定期监测 HCG B. 定期 X 线胸片检查
C. 采用宫内节育器避孕 D. 出现咳嗽、咯血及时就诊

6. 某女, 5 年前行人工流产术后, 未采取避孕措施, 至今未孕, 考虑输卵管因素导致不孕可能性大, 目前首先应采用的检查是
- A. 诊刮术
B. 输卵管通液术
C. 免疫检查
D. 性交后试验
7. 关于妊娠合并心脏病, 下列描述正确的是
- A. 产后 1 周时最易发生心衰
B. 目前围生期心肌病发生率最高
C. 妊娠足月时, 循环血容量达到高峰
D. 妊娠 32~34 周时, 心脏排血量增加 30%~40%
8. 子宫内膜脱落不全引起的有排卵性功血, 其月经表现为
- A. 月经周期延长
B. 月经期延长
C. 月经周期缩短
D. 月经期缩短
9. 胎儿监护中无负荷试验的目的是观察
- A. 胎心率周期性变化
B. 胎儿宫内储备能力
C. 宫缩对胎心率的影响
D. 子宫对催产素的敏感性
10. 关于药物避孕的健康指导, 下列描述正确的是
- A. 哺乳期妇女不宜口服避孕药
B. 如有生育需求, 可提前一年停药
C. 产后应在行经后方可使用避孕药
D. 复方短效口服避孕药若漏服应在 24 小时内补服
11. 关于产褥感染, 下列描述正确的是
- A. 血栓性静脉炎一般出现在产后 3~7 天
B. 引起产褥感染最常见的细菌是溶血性链球菌
C. 产褥感染的妇女每日饮水量不应超过 1000ml
D. 产褥感染是由于分娩后生殖器官防御能力下降所致
12. 下列不属于化疗联合用药原则的是
- A. 严格按照先后顺序给药
B. 几种药物的作用机制不同
C. 药物的副作用不能叠加
D. 单药应用对肿瘤有效
13. 某初产妇, 妊娠 39 周, 主诉: 规律性腹痛 12 小时, 阴道流水 3 小时, 排尿困难。入院检查: 有规律宫缩, 每 5~6 分钟一次, 持续 20~25 秒, 宫缩时子宫不硬, 按压有凹陷, 宫口开大 1.5cm, 孕妇呈疲乏面容, 脉搏 85 次/分。该孕妇的医疗诊断是
- A. 原发性子宫收缩乏力
B. 潜伏期延长
C. 继发性子宫收缩乏力
D. 活跃期延长

23. 胎盘的组成包括
- A. 羊膜、包蜕膜、底蜕膜 B. 羊膜、底蜕膜、真蜕膜
- C. 羊膜、叶状绒毛膜、真蜕膜 D. 羊膜、叶状绒毛膜、底蜕膜
24. 对滋养细胞疾病诊断最有价值的激素水平测定是
- A. 绒毛膜促性腺激素 B. 卵泡刺激素
- C. 黄体生成素 D. 雌激素
25. 自月经第一日起至下次月经第一日的时间间隔称为
- A. 增生期 B. 分泌期
- C. 月经期 D. 月经周期

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分）

26. 应用顺铂化疗时，为减轻肾脏损害，患者每小时尿量应大于_____ml。
27. 妇科腹部手术伤口的感染一般发生在手术后第_____天左右。
28. 新生儿卡介苗的接种法有_____法和划痕法。
29. 妊娠合并心脏病的产妇，当心功能达到_____级及以上者不宜哺乳。
30. 骨盆出口狭窄时可测量骨盆出口_____径。
31. 妊娠中期胎盘产生的人类胎盘生乳素及雌、孕激素，在不同程度上都有对抗_____的作用，因此糖尿病孕妇应注意监测血糖。
32. 紧急避孕常用的方法是_____和服用紧急避孕药物。
33. 由于精神因素导致的闭经属于_____性闭经。
34. 输卵管妊娠流产或破裂后，胚胎死亡，血块与周围组织粘连、机化，形成_____性异位妊娠。
35. 阴道分娩时，最难通过产道的胎儿部分是_____。
36. 妊娠期母体乳晕的皮脂腺肥大形成散在的结节状小突起，称为_____。
37. 骨盆的关节包括_____、骶髂关节和骶尾关节。
38. 淋病的治疗应以_____为原则，用药应以及时、足量、规范为原则。
39. 滋养细胞肿瘤脑转移后分为瘤栓期、脑瘤期和_____期三个阶段。
40. 妇科肿瘤化疗时，血小板低于_____×10⁹/L 即有自发性出血的可能。

三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

41. 滋养细胞疾病
42. 宫颈活体组织检查
43. 前庭大腺
44. 避孕
45. 剖宫产术

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

46. 简述正常分娩后产妇会阴护理措施。
47. 简述慢性盆腔炎患者的护理措施。
48. 简述妊娠高血压疾病使用硫酸镁的用药注意事项和中毒解救方法。
49. 简述卵巢癌切除肠道转移病灶术后胃肠减压的护理措施。
50. 简述分娩后正常新生儿即时护理的主要措施。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

51. 患者，女，51 岁，主诉“阴道排液伴接触性出血 1 年”入院。患者近 1 年来无明显诱因出现阴道流血，鲜红色，伴白带增多呈米汤样，无异味，性生活后阴道流血增多，伴有血块。妇科检查：宫颈呈桶状，后唇见一约 5cm×4cm×4cm 大小的菜花状赘生物，质脆，触之易出血。辅助检查：宫颈活检病理回报显示组织学分级Ⅱ级。根据以上资料，请回答：
 - （1）该患者的医疗诊断（2 分）；
 - （2）该类患者腔内照射后的观察与护理（8 分）。
52. 某产妇，孕期正常。临产后，第一产程进展缓慢，给予缩宫素加强宫缩，于 1 小时前在会阴侧切下，自然阴道分娩一男婴，体重 3800 克。胎儿娩出后 10 分钟内，阴道流出大量血液约 600ml，呈暗红色。检查子宫底不清、质软。根据以上资料，请回答：
 - （1）该产妇产后出血最可能的主要原因（2 分）；
 - （2）产后出血的护理措施（8 分）。