

全国 2016 年 4 月高等教育自学考试

护理学基础试题

课程代码:02997

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 34 小题,每小题 1 分,共 34 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 生物、心理、社会医学模式的特点是

- A. 强调身心一元论
- B. 从生物学的角度研究人和人的健康
- C. 在方法论方面,以还原论为基础
- D. 将疾病看作是独立于社会行为的实体

2. 奥瑞姆认为自理缺陷是

- A. 个人在成长发展过程中遇到的不利情况
- B. 健康欠佳时的自理需求
- C. 个体的自理力无法满足其治疗性自理需求
- D. 不同发展时期的特殊需求

3. 罗依认为,固有刺激是

- A. 一些诱因性的刺激
- B. 对当时情境有影响的刺激
- C. 构成本人特征的刺激
- D. 需立即适应的刺激

4. 纽曼认为,初级预防的重点是

- A. 帮助护理对象恢复功能
- B. 帮助护理对象早期发现、早期治疗症状
- C. 保护护理对象系统的基础结构
- D. 控制或改变应激源

5. 属于压力适应特征的是

- A. 适应是一种被动的过程
- B. 适应能力因人而异
- C. 适应本身不具有应激性
- D. 适应最终目的是维持外环境的稳定

6. 依据爱瑞克森的理论,老年期的主要矛盾冲突是

- A. 自我认同对角色紊乱
- B. 亲密对孤独
- C. 有成就对停滞
- D. 完善对失望

7. 陈述准确的预期目标是

- A. 使患者一周内下床活动
- B. 协助患者下床活动
- C. 患者能下床活动
- D. 二周内借助支撑物下床活动

8. 当患者哭泣时,护士应

- A. 劝阻患者不要哭,保持冷静
- B. 陪他待一会,鼓励他把话讲出来
- C. 离开,不去干扰患者
- D. 安慰患者疾病并不严重,很快会好的

9. 医院中最常见的机械性损伤是

- A. 挤压和切割伤
- B. 切割伤和跌倒
- C. 坠床和跌倒
- D. 坠床和挤压伤

10. 应用碱性戊二醛时,为调节 pH 值,应先加入

- A. 亚硝酸钠
- B. 醋酸钠
- C. 碳酸氢钠
- D. 氯化钠

11. 正确的煮沸消毒方法是

- A. 橡胶类物品在冷水中放入
- B. 中途加入其他物品,需等再次水沸后计时
- C. 在水中加入亚硝酸钠可提高杀菌效果
- D. 煮沸 30 分钟即可杀灭多数细菌芽孢

12. 肺部感染行体位引流者应取

- A. 膝胸卧位
- B. 仰卧屈膝位
- C. 侧卧位
- D. 头低足高位

13. 老年人应用手杖的目的是

- A. 增加身体重量
- B. 增加摩擦力
- C. 扩大支撑面
- D. 降低身体高度

14. 患者女性,48 岁,护士为其测量脉搏时发现每隔 2 个正常搏动出现 1 次期前收缩,此心律不齐称为

- A. 三联律
- B. 二联律
- C. 间歇脉
- D. 绌脉

15. 吸气性呼吸困难多见于

- A. 代谢性酸中毒患者
- B. 慢性阻塞性肺疾病患者
- C. 支气管哮喘患者
- D. 喉头水肿患者

16. 睡眠性呼吸暂停患者可有

- A. 睡眠时间长且入睡后难以唤醒
- B. 严重打鼾
- C. 不能控制、短暂的突发性睡眠
- D. 四肢麻痹

17. 应用药物止痛,应注意

- A. 对手术后患者,尽量不用止痛药物
- B. 对重度疼痛患者,应使用非麻醉性镇痛药
- C. 对慢性疼痛患者,宜在疼痛发生前给药
- D. 只要患者主诉疼痛就应用药

18. 为昏迷患者行口腔护理,正确的是

- A. 选用生理盐水
- B. 开口器应从门齿处放入
- C. 擦洗动作要轻柔,活动义齿要妥善固定
- D. 擦洗完毕,给患者漱口

19. 鼻饲时,为提高昏迷患者插管的成功率,在插管至会厌部时应将患者下颌

- A. 后仰
- B. 侧向右侧
- C. 侧向左侧
- D. 贴近胸骨

20. 胆囊造影前一日晚餐应给予

- A. 无脂肪、低蛋白饮食
- B. 高热量、高蛋白饮食
- C. 低蛋白、低糖饮食
- D. 高脂肪、高蛋白饮食

21. 患者男性,35岁,因“急性肾炎”入院,应给予

- A. 少渣饮食
- B. 要素饮食
- C. 低蛋白饮食
- D. 低胆固醇饮食

22. 呕吐物呈碱味,常提示

- A. 幽门梗阻
- B. 胃内出血
- C. 胆汁反流
- D. 肠梗阻

23. 无尿指 24 小时尿量少于

- A. 50ml
- B. 100ml
- C. 400ml
- D. 500ml

24. 患者排出的新鲜尿液混浊,静置后有白色絮状沉淀,加酸后混浊不消失,应考虑为

- A. 脓尿
- B. 胆红素尿
- C. 血红蛋白尿
- D. 乳糜尿

25. 服用磺胺类药物后需多饮水,目的是

- A. 避免损害造血系统
- B. 维持血液 pH 值
- C. 增加药物溶解度,避免结晶析出
- D. 减轻胃肠道刺激

26. 服用地高辛前测心率 56 次/分,此时应

- A. 加大剂量服用
- B. 减小剂量服用
- C. 停止服用
- D. 按原剂量正常服用

27. 发生空气栓塞时,应立即使患者取

- A. 去枕、头低左侧卧位
- B. 去枕、头低右侧卧位
- C. 头高脚低位
- D. 俯卧位

28. 对急性肺水肿患者给予 30%~50% 的酒精湿化后的氧气吸入是为了
- A. 降低肺泡表面张力
B. 减少静脉血回流
C. 使肺部毛细血管扩张
D. 降低肺泡内泡沫的表面张力
29. 留取 24 小时尿标本, 在集尿瓶中加入盐酸的目的是
- A. 固定尿中有机成分
B. 防止尿液颜色改变
C. 保持尿液的化学成分不变
D. 中和尿中碱性物质
30. 患者女性, 38 岁。扁桃体摘除术后, 体温 37.5℃, 脉搏 102 次/分, 呼吸 22 次/分。应放置冰囊于
- A. 前额
B. 颈前颌下
C. 腹股沟
D. 腋下
31. 患者呼之能答应, 但不能回答问题, 不能控制排尿, 对刺激有反应, 该患者的意识障碍为
- A. 意识模糊
B. 嗜睡
C. 朦胧
D. 浅昏迷
32. 使用绷带包扎最为重要的一点是
- A. 无菌包扎
B. 关节制动
C. 松紧适度
D. 制止出血
33. 患者男性, 37 岁。诊断为慢性粒细胞白血病, 随着病情进一步恶化, 表现为嗜睡, 情感减退。此时该患者的心理反应处于
- A. 否认期
B. 协议期
C. 抑郁期
D. 接受期
34. 患者灌肠后排便 1 次, 后又自行排便 1 次, 记录为
- A. 2/E
B. 1/1/E
C. E/1/1
D. E/2

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 5 小题, 每空 1 分, 共 10 分)

35. 医源性损害指由于医务人员 ▲ 或 ▲ 的失误而对患者造成生理或心理上的损害。
36. 隔离可分为 ▲ 隔离和 ▲ 隔离两大类。
37. 外呼吸又称 ▲ 呼吸; 肺脏或胸膜病变时, 会出现 ▲ 的呼吸运动。
38. 敌百虫中毒禁用 ▲ 洗胃; 氰化物中毒禁用 ▲ 洗胃。
39. 护理临终患者的原则是 ▲、▲、注重心理、整体服务和人道主义。

三、名词解释题(本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

40. 患者角色缺如
41. 睡眠性呼吸暂停
42. 治疗饮食
43. 尿失禁

四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分)

- 44. 奥瑞姆的全补偿系统适用于哪些情况?
- 45. 简述制订护理措施应遵循的原则。
- 46. 股静脉穿刺常用于哪些情况? 穿刺过程中应注意哪些事项?
- 47. 头颈部出血、上臂出血、下肢出血时,如何有效实施指压法止血?

五、综合题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

- 48. 患者李某,男性,78 岁。肺癌晚期,长期卧床。查体:T38.5℃,P88 次/min,R24 次/min, BP 115/80mmHg,身高 176cm,体重 52kg。患者骶尾部皮肤呈紫红色,触之有硬结,表面有数个大小不等的水泡。

问题:

- (1)该患者发生压疮的危险因素有哪些?
- (2)患者处于压疮的第几期? 如何护理?

- 49. 患者张某,男性,45 岁。静脉输血后约 30 分钟左右,出现寒战、发热,体温升高至 38.8℃,伴头痛、恶心。

问题:该患者出现了什么问题? 原因是什么? 如何处理?