

绝密 ★ 考试结束前

全国 2017 年 10 月高等教育自学考试
护理学研究试题
课程代码:03008

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题: 本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 下列研究对象的权利属于护理研究中的“公正原则”的是
 - A. 隐私权
 - B. 充分认知的权利
 - C. 自主决定权
 - D. 不被剥削或利用的权利
2. 按照文献的级别, 期刊论文属于
 - A. 一次文献
 - B. 二次文献
 - C. 三次文献
 - D. 零次文献
3. 按照变量值的性质, 身高、体重属于
 - A. 二项分类变量
 - B. 有序分类变量
 - C. 多项分类变量
 - D. 连续型变量
4. 根据研究的对象和要解决问题的性质, “唐山市市区及区级以上医院护理人员死因资料的减寿分析”的研究中研究问题的类别为
 - A. 调查研究
 - B. 实验观察
 - C. 资料分析
 - D. 经验体会
5. 某研究的研究假设为“吸烟会增加肺癌的发生率”, 此研究假设为
 - A. 有方向性假设
 - B. 无效假设
 - C. 无方向性假设
 - D. 统计学假设

6. 量性研究的结果陈述形式是
A. 引述 B. 评论
C. 数字 D. 故事
7. 在进行医学文献创造性阅读过程中，在某个地方有意识地停顿下来，以已经阅读的内容为基础，设想以后的内容，再与文献中后面的内容对比，检验自己的想象力、判断力和创造力。这种文献阅读方法是
A. 质疑法 B. 推测法
C. 比较法 D. 反馈法
8. 实验性研究和非实验性研究的根本区别在于
A. 是否设立对照组 B. 是否有干扰因素
C. 是否随机抽样 D. 有无干预
9. 在研究设计时将研究对象自身在干预前后的情况进行比较的方法是
A. 随机对照 B. 自身对照
C. 组间对照 D. 配对对照
10. 从总体中随机抽取的部分观察单位是
A. 抽样 B. 总体
C. 样本 D. 随机
11. 入院率偏倚属于
A. 选择性偏倚 B. 报告偏倚
C. 测量偏倚 D. 回忆偏倚
12. 研究者通过与研究对象进行面对面的、有目的的会谈，直接从研究对象处获取资料的方法是
A. 调查法 B. 访谈法
C. 问卷法 D. 观察法
13. 生物测量法的缺点是
A. 结果主观性高
B. 结果不够精确
C. 测量仪器的安全性能难把握
D. 不适用收集研究对象的心理、社会方面的资料
14. 档案记录法的缺点是
A. 涉及伦理问题 B. 有应答偏差
C. 没有选择性 D. 不经济
15. 重测信度越趋近于下列哪个数值时意味着重测信度就越高？
A. 0.01 B. 0.05
C. 0.08 D. 1.00

16. 下列有关表面效度的描述，错误的是
- 是停留在问卷表面的测定
 - 对效度的评价是用“有或无”来反映的
 - 可以作为工具质量的有力证据
 - 用于研究工具效度测定的开始阶段
17. 下列属于计量资料的是
- 血压 (mmHg)
 - 学历 (小学/中学/大学)
 - 性别 (男/女)
 - 职称 (护士/护师/主管护师)
18. 某研究采用自身对照的方法，对 20 例脑卒中患者提供家庭康复指导，分别在指导前和指导后 3 个月，采用日常生活能力量表进行测评。研究者欲了解家庭康复指导后，患者日常生活能力是否有改善。此时研究者应该使用的统计学分析方法是
- 两独立样本 t 检验
 - 单样本 t 检验
 - 配对 t 检验
 - 方差分析
19. 在进行四格表卡方检验时，如果发现研究样本的总例数少于 40 例，此时应该选择的卡方检验的具体方法是
- 四格表专用公式
 - 四格表校正公式
 - Fisher 确切概率法
 - 配对卡方检验公式
20. 下列选项中不属于护理研究论文的四段式撰写内容的是
- 摘要
 - 前言
 - 材料与方法
 - 结果
- 二、多项选择题：本大题共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。**
21. 科学研究应遵循的原则是
- 客观性原则
 - 个性原则
 - 通用性原则
 - 实验原则
 - 可重复性原则
22. 因变量的特征有
- 其变化能够被研究者操纵控制
 - 是根据需要有待观测的因素
 - 随自变量的变化而变化
 - 其变化导致研究对象发生反应
 - 是能够以某种反应参数来表征的可测量因素
23. 研究指标应具备的特征是
- 特异性
 - 准确性
 - 客观性
 - 灵敏性
 - 可行性

- A. 立题依据
- B. 研究的目的
- C. 研究的背景
- D. 研究的方法
- E. 研究的意义

25. 质性研究主要包括

- A. 现象学研究法
- B. 根基理论研究法
- C. 人种学研究法
- D. 实验性研究法
- E. 类实验性研究法

26. 最为常用的概率抽样方法有

- A. 定额抽样
- B. 单纯随机抽样
- C. 系统抽样
- D. 分层抽样
- E. 整群抽样

27. 使用问卷调查法收集资料的形式包括

- A. 邮寄问卷
- B. 非结构式访谈
- C. 现场发放
- D. 半结构式访谈
- E. 通过电话访谈完成问卷调查

28. 常见的档案资料来源包括

- A. 疾病报告
- B. 医疗、护理服务工作记录
- C. 健康检查资料
- D. 访谈资料
- E. 专题疾病的调查

29. 下列可以用来反映研究工具的内在一致性这一特征的方法包括

- A. 折半信度
- B. KR-20 值
- C. 评定者间信度
- D. 复本信度
- E. Cronbach' α 系数

30. 下列有关抽样误差的描述正确的是

- A. 只要是抽样研究，就必然存在抽样误差
- B. 尽可能多地增加样本量可以降低抽样误差
- C. 选择变异程度大的研究指标可降低抽样误差
- D. 尽可能采取随机抽样的方法降低抽样误差
- E. 抽样误差是由于抽样的偶然性导致的

31. 下列用于统计推断的指标是

- A. 构成比
- B. 卡方值
- C. t 值
- D. 中位数
- E. 最大值

32. 下列有关研究工具的信度与效度关系的描述，正确的是

- A. 不是所有的研究工具都有信度和效度
- B. 信度和效度是截然孤立的
- C. 信度低的工具效度肯定不高
- D. 信度高的工具效度可能低
- E. 研究工具的信度和效度是程度上“高”或“低”的问题

33. 下列属于等级资料的是

- A. 病程（年）
- B. 职业（工人/农民/干部）
- C. 满意度（非常满意/一般/不满意）
- D. 行为发生（总是/经常/偶尔）
- E. 关系（配偶/子女/兄弟姐妹）

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释题：本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。

34. 假设

35. 理论框架

36. 混杂性偏倚

37. 观察性参与者

38. 内容效度

39. 护理经验论文

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

40. 简述文献检索和文献回顾的目的。

41. 简述生物医学测量法的目的。

42. 简述直条图的定义以及绘制时的注意事项。

43. 简述综述中引用文献的基本原则。

五、应用题：本大题共 1 小题，10 分。

44. 请分析在“社区护理干预对糖尿病患者运动方式的影响”研究中，研究对象是谁？

为了排除与研究无关的干扰因素的影响，突出实验中干预措施的效应，研究者应该采用什么类型的研究设计？请具体描述研究设计的内容。